

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Feuillet d'information destiné au patient Protocole : Pazopanib

Rédaction : mai 2014

Révision : novembre 2017

Médicament	Horaire d'administration
Pazopanib	Comprimés à prendre par voie orale une fois par jour à la même heure, une heure avant ou deux heures après avoir pris de la nourriture.
<i>Prendre en continu</i>	

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Généralités associées à votre traitement

- › Ce médicament est utilisé pour empêcher la multiplication des cellules anormales et les détruire.
- › Des **prises de sang**, des **analyses d'urine** et des **vérifications de votre pression sanguine** seront faites durant votre traitement. La dose du pazopanib pourra être ajustée ou encore le traitement pourra être retardé, si nécessaire, selon le résultat des prises de sang, des analyses urinaires ou selon les effets indésirables survenus en cours de traitement.
- › De la **fatigue** peut survenir durant vos traitements. Ceci est habituellement temporaire et peut être relié à plusieurs facteurs (médication, stress, maladie, etc.). Gardez un bon niveau d'activité mais reposez-vous lorsque vous en sentez le besoin.
- › Une **diminution de l'appétit** peut survenir. Mangez plus souvent, mais en petite quantité à la fois.
- › Une **altération du goût** peut se manifester. Rehaussez le goût des aliments avec des fines herbes ou du jus de citron. Masquez le goût amer métallique à l'aide de fruits, de gomme à mâcher sans sucre, etc.
- › La consommation d'**alcool**, en petite quantité, est considérée sécuritaire et n'affectera pas l'efficacité du traitement.
- › Une **vie sexuelle** active n'est pas interdite durant vos traitements. Cependant, une diminution du désir peut survenir de façon temporaire durant cette période. Cela peut être influencé par plusieurs facteurs, dont la fatigue et le stress.
- › **Chez l'homme**, le pazopanib peut nuire à la fertilité. Le pazopanib peut se retrouver dans le sperme. Cette diminution de la **fertilité** n'entrave aucunement l'érection et l'activité sexuelle. Malgré cette baisse possible de fertilité, une grossesse est toujours possible. Si vous avez des relations sexuelles avec une femme en âge de procréer, l'utilisation d'un moyen de **contraception** pendant le traitement est fortement recommandée.
- › **Chez la femme** non ménopausée, la prise d'un moyen de **contraception** pendant le traitement et jusqu'à 8 semaines suivant la fin du traitement est donc fortement recommandée. Des effets nocifs au niveau de l'embryon pourraient survenir si le médicament est administré pendant la grossesse. L'allaitement est contre-indiqué pendant toute la durée du traitement.
- › Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'intention de consommer d'autres médicaments (même ceux ne nécessitant pas de prescription), des produits de santé naturels, ou si vous devez recevoir un vaccin. Certains pourraient provoquer une interaction avec votre traitement et en diminuer l'efficacité ou en augmenter les effets indésirables.
- › Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et la disposition sécuritaire des liquides biologiques (p. ex. : urine, selles, etc.) pour protéger l'environnement et vos proches.
- › Assurez-vous d'avoir toujours en main la liste complète de tous vos médicaments et suppléments alimentaires, vitamines et autres produits de santé naturels et d'en remettre une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables et mesures à prendre

Effets indésirables	Mesures à prendre
Des maux de cœur habituellement légers peuvent survenir durant votre traitement.	<ul style="list-style-type: none">› Vous pourriez avoir à prendre des médicaments au besoin contre les maux de cœur.› Communiquez avec un membre de l'équipe si vous avez des maux de cœur qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.
Selon les personnes, un éclaircissement des cheveux plus ou moins important peut se produire. En général, ceci survient 2 à 3 semaines après le début du traitement. Cependant, rassurez-vous, les cheveux repousseront à la fin des traitements.	<ul style="list-style-type: none">› Utilisez un shampooing doux.› Évitez de brosser les cheveux vigoureusement.› Évitez les fixatifs, teintures et permanentes.
Cependant, vos cheveux et moins fréquemment votre peau pourraient subir une décoloration et devenir jaunâtres. Ceci peut survenir après 1 à 2 semaines de traitement.	<ul style="list-style-type: none">› Rassurez-vous, la situation reviendra à la normale après la fin du médicament.
Une diminution des globules blancs peut survenir durant le traitement. Vous pourriez être plus à risque de contracter des infections durant cette période.	<ul style="list-style-type: none">› Lavez-vous les mains souvent.› Durant cette période, évitez d'entrer en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses.› Consultez votre médecin ou présentez-vous immédiatement à l'urgence si vous faites de la fièvre 38,3°C (101°F) une fois ou 38°C (100.4°F) 2 fois à une heure d'intervalle.› Communiquez rapidement avec un membre de l'équipe si vous présentez d'autres signes d'infection (fièvre, frisson, toux, maux de gorge, douleur lorsque vous urinez, etc.).› Évitez la prise d'acétaminophène (p. ex : Tyléno^{MC}, Ataso^{MC},..) et d'anti-inflammatoire (p. ex : Motrin^{MC}, Advil^{MC}, Aleve^{MC}) en cas de fièvre.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
Une diminution des plaquettes peut survenir durant le traitement. Vous pourriez faire des bleus ou avoir tendance à saigner plus facilement qu'à l'habitude.	<ul style="list-style-type: none">› Utilisez une brosse à dents à poils souples.› Vérifiez auprès de votre pharmacien avant de consommer des médicaments contenant de l'Aspirine^{MC}, de l'ibuprofène, du naproxène ou d'autres anti-inflammatoires.› Communiquez avec un membre de l'équipe si des ecchymoses (bleus) se manifestent de façon inhabituelle ou si vous avez tendance à saigner facilement du nez ou des gencives.
Des saignements mineurs tels que des saignements de nez peuvent survenir.	<ul style="list-style-type: none">› Asseyez-vous droit en penchant légèrement la tête vers l'avant.› Pincez vos narines et appliquez une pression continue pendant quelques minutes. Vérifiez si le saignement est arrêté.› Évitez de vous moucher pendant les 12 heures suivant le saignement.› Pour tout saignement de nez qui persiste plus de 20 minutes, consultez immédiatement votre médecin ou présentez-vous à l'urgence.
De l'hypertension artérielle (augmentation de la pression) pourrait se développer dans les premiers mois de votre traitement.	<ul style="list-style-type: none">› Votre pression artérielle pourrait être vérifiée durant vos visites chez le médecin.› À la demande d'un membre de l'équipe, vous pourriez avoir à mesurer régulièrement votre pression et noter les résultats dans un journal de bord.› En cas d'hypertension artérielle, des médicaments pourront vous être prescrits par votre médecin.
Une hyperglycémie (augmentation de vos taux de sucre dans le sang) pourrait survenir.	<ul style="list-style-type: none">› Votre glycémie (taux de sucre) pourrait être vérifiée durant vos visites chez le médecin ou lors de vos prises de sang.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
<p>De la diarrhée peut survenir durant votre traitement. Habituellement, la diarrhée n'est pas sévère et ne s'aggrave pas avec la durée du traitement.</p>	<p>La diarrhée doit être traitée avec le lopéramide (Imodium^{MD}).</p> <p>Si la diarrhée est légère à modérée (moins de 4 selles molles par jour) :</p> <ul style="list-style-type: none">› Suivez les instructions sur l'emballage de lopéramide : prenez 2 comprimés au départ puis 1 comprimé après chaque selle liquide (maximum de 8 comprimés par période de 24 heures). <p>Autres mesures à prendre :</p> <ul style="list-style-type: none">› Buvez beaucoup de liquide (8 à 10 verres par jour) à moins d'avis contraire de votre médecin.› Mangez et buvez souvent mais en petite quantité.› Si vous avez plus de 4 à 6 selles molles par jour ou de la diarrhée durant la nuit ou si la diarrhée ne s'améliore pas dans les 24 heures suivant la prise du lopéramide : Avez votre équipe médicale.› Si vous présentez une diarrhée accompagnée de fièvre, avisez immédiatement un membre de l'équipe ou présentez-vous à l'urgence.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables	Mesures à prendre
<p>La réaction main-pied peut survenir durant votre traitement. Vous pourriez avoir un changement de sensation sur la peau, de l'enflure, de la rougeur et un épaissement de la peau au niveau de la paume de vos mains et/ou de la plante de vos pieds. Ces symptômes apparaissent habituellement au cours des 2 à 4 premières semaines du traitement. Parfois, de la rougeur et de l'enflure ainsi que de la douleur peuvent apparaître sur le bout des doigts, les orteils et sur les autres points de pression ou de flexion (coudes, jointures).</p>	<p>Afin de prévenir cet effet :</p> <ul style="list-style-type: none">› Évitez de porter des chaussures trop serrées ou trop petites. Portez des semelles absorbantes en mousse, des coussinets en gel pour protéger les points de pression et des chaussettes en coton.› Éviter les exercices vigoureux ou les activités qui mettent les mains et les pieds à rude épreuve durant au moins les 2 à 4 premières semaines de traitement.› Faites une manucure ou un pédicure par un professionnel afin d'enlever la peau épaisse et les callosités.› Hydratez la peau régulièrement à l'aide d'une crème épaisse et émollissante non parfumée.› Épongez vos mains et vos pieds plutôt que frotter la peau pour la sécher.› Gardez la peau à l'air libre afin de transpirer le moins possible.› Portez des gants de caoutchouc pour laver la vaisselle.› Évitez l'eau chaude; lavez vos mains et vos pieds à l'eau tiède.› Un membre de votre équipe de soins peut également vous suggérer des crèmes qui peuvent être appliquées sur les mains et les pieds. <p>Si des symptômes apparaissent :</p> <ul style="list-style-type: none">› Si ces effets surviennent et nuisent à vos activités quotidiennes, cessez la prise du médicament et avisez un membre de l'équipe dès que possible.
<p>Le traitement peut affecter votre foie.</p>	<ul style="list-style-type: none">› Communiquez sans tarder avec un membre de l'équipe si vous remarquez une coloration jaune de vos yeux et de votre peau, des selles de couleur de blanchâtre ou une urine de couleur orangée. Des prises de sang seront effectuées afin de vérifier le bon fonctionnement de votre foie.

Mise en garde

Le présent feuillet d'information a pour objectif de vous faire connaître les effets indésirables les plus souvent constatés à la suite de l'administration de votre traitement. Veuillez toutefois noter que pour toute prise de médicaments, il existe une possibilité que ceux-ci provoquent des effets indésirables rares et qu'il nous est difficile de prévoir quels patients en seront affectés.

Effets indésirables rares pouvant être sévères ou sérieux à rapporter rapidement à votre médecin

- | | |
|---|---|
| Des battements rapides ou irréguliers du cœur, de l'essoufflement et de l'enflure aux chevilles peuvent rarement survenir. | › Si vous notez un de ces effets, communiquez rapidement avec un membre de l'équipe. |
| Rarement, une douleur ou des crampes abdominales intenses peuvent se produire accompagnées de selles avec du sang. | › Avisez rapidement un membre de l'équipe et consultez un médecin.
› Présentez-vous sans délai à l'urgence si ces douleurs sont subites et intenses et accompagnées de maux de cœur, de vomissements ou de constipation. |
-

Considérations spéciales liées à votre traitement

- › Prenez vos comprimés de pazopanib, tel que prescrit 1 fois par jour. Vous devez prendre vos comprimés à jeun avec un grand verre d'eau soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas. Essayez de prendre vos comprimés le plus régulièrement possible, à la même heure à chaque jour.
- › **Si vous oubliez une dose**, vous pouvez la reprendre dès que vous y pensez s'il reste plus de 12 heures avant votre prochaine dose. S'il reste moins de 12 heures avant votre prochaine dose, attendez votre prochaine dose mais ne la doublez pas.
- › Les comprimés doivent être avalés entiers. Ne pas croquer, couper ou écraser les comprimés.
- › Lavez- vous immédiatement les mains, après avoir manipulé vos comprimés.
- › Conservez vos comprimés loin de la portée des enfants, à la température de la pièce, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.
- › Ne jetez pas à la maison le médicament non utilisé. Apportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit détruit sans danger.
- › Vous devez éviter de consommer du **pamplemousse**, de l'orange amère de Séville, de la carambole, du pomelo, de la grenade ou des aliments en contenant car ceci pourrait augmenter les effets indésirables du pazopanib.
- › Consulter votre pharmacien avant d'utiliser un **antiacide** (contre l'acidité de l'estomac) disponible sans ordonnance.
- › Avisez votre dentiste ou médecin si vous devez subir une chirurgie. Le pazopanib diminue la guérison des plaies. Il doit être arrêté avant la chirurgie et repris ensuite selon l'évaluation de votre médecin.

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

Entre ___ h ___ et ___ h ___ (du lundi au vendredi)